

SCHEDE: 0080 - Oasi Pinedo

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 130

Tipo popolamento: Di riserva

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: PC Comuni: Caorso

Tavola CTR: 162-NO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 566792

Superficie totale: 17,5 ha

N 992480

SPECIE IDONEE: Arboree principali: qro

Referenti: Provincia di Piacenza

Confini: Da Caorso, seguire le indicazioni per la località di Zerbio e di qui verso "Oasi Pinedo", poco aver costeggiato la recinzione della centrale di Caorso, in corrispondenza di un canale, si trova un lungo filare di farnia e ontano nero.

L'area ricade all'interno del SIC IT 4010018

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Proprietà non indicate

PORTASEME

Portaseme non indicati

Motivi di iscrizione: Interessante filare di farnia, con individui di grosse dimensioni e di ottimo fenotipo.

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 50

massima: n.i.

ESPOSIZIONE primaria: Pianeggiante

secondaria: Non disponibile

Inclinazione° : 0

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): 684

Precipitazioni medie estive (mm): 156

Temperatura media annua (C): 12,1

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Area di espansione del corso d'acqua principale**Substrato:** Sabbie

Suoli: suoli pianeggianti, localizzati in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, con pendenza che varia tipicamente da 0,05 a 0,1; molto profondi, a tessitura media, a moderata disponibilità di ossigeno, calcarei, moderatamente alcalini. Localmente la disponibilità di ossigeno è buona. Questi suoli si sono formati da sedimenti fluviali a tessitura media, con frequente presenza di strati a tessitura grossolana. Secondo la classificazione FAO, rientrano negli Calcaric Cambisols.

Tipi forestali: il Tipo forestale più diffuso all'interno del Sito è il Saliceto ripario di salice bianco in mosaico con ampi pioppeti artificiali e coltivi; mentre gli originali boschi misti, riferibili al Querceto-carpinetto golenale, occupano ridotte superfici rispetto alle reali potenzialità. Sui depositi aridi ciottolosi più prossimi al Po sono inoltre presenti formazioni di pioppo nero.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: fustaia**Forma di governo secondaria:** ceduo composto (fustaia sopra ceduo / ceduo sottofustaia)**Fase di sviluppo:** non definita**Struttura:** biplana

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione pianificata: Nessuna gestione pianificata

Situazione evolutivo-culturale: Filare di farnia con querce ad alto fusto e sottostante ceduo di ontano nero