

SCHEDE: 0170 - Borgo Rivola
LOCALIZZAZIONE
Codice Regione di provenienza: 310

Tipo popolamento: Di riserva

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: RA **Comuni:** Riolo Terme

Tavola CTR: 239SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 714635

Superficie totale: 20,2 ha

N 905707

SPECIE IDONEE: Altre specie arboree: umi

Referenti: Provincia di Ravenna

Confini: Accesso dalla S.S. 306 per Casola Valsenio.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Proprietà non indicate

PORTASEME umi UTM E 714353; N 905553 Villa Miola
 umi UTM E 714701; N 905656 Rio del Cosco
 umi UTM E 714781; N 905777 Borgo Rivola 1
 umi UTM E 715024; N 905675 Borgo Rivola 2

Motivi di iscrizione: Piante sicuramente spontanee, di buona fruttificazione e facilità di raccolta del seme.

DATI STAZIONALI	QUOTE minima: n.i.	media: 103	massima: 126
	ESPOSIZIONE primaria: Pianeggiante	secondaria: Non disponibile	Inclinazione° : 2
CLIMA	Precipitazioni medie annue (mm): n.i.	Precipitazioni medie estive (mm): n.i.	
	Temperatura media annua (C): n.i.	Indice di Gams: n.i.	Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Terrazzo antico (pianalto) a superficie ondulata

Substrato: Argille

Suoli: Antichi sedimenti fluviali a tessitura media e, localmente, fine hanno dato luogo a suoli 3Bc a pendenza tipica 0,2-0,8%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente hanno tessitura fine e disponibilità di ossigeno moderata. Tali suoli si alternano al tipo 3Af con caratteristiche analoghe e talvolta al tipo 5Ba con pendenza tipica 15-30%; superficiali; a tessitura fine; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Sono inoltre frequentemente rocciosi. Localmente sono moderatamente profondi, a tessitura media. Mod.frequenti i calanchi.

Tipi forestali: la copertura vegetale dell'area è costituita prevalentemente dalle tipiche formazioni boschive del medio Appennino, formate da Querceti mesoxerofili di roverella, localizzati sui versanti più caldi, ed Ostietri mesofili sul versante settentrionale ed orientale, in mosaico a lembi di Castagneto.

POPOLAMENTO FORESTALE
Forma di governo principale: bosco di neoformazione (invasione / ricolonizzazione)

Forma di governo secondaria: non definita

Fase di sviluppo: popolamento irregolare

Struttura: pluristratificata

DATI DENDROMETRICI **Numero piante ad ha:** n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): 8

Diametro medio di area basim. media (cm): 5,0

Gestione
pianificata:
Situazione Filari spontanei da siepi in evoluzione.

evolutivo-culturale: