

SCHEDA: 0093 - Oasi dei Ghirardi

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 420

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: PR Comuni: Borgo val di Taro, Albareto, Compiano

Tavola CTR: 216NO; 216SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 557672

Superficie totale: 881,7 ha

N 928594

SPECIE IDONEE: Arboree principali: qce, qpu, tco

Altre specie arboree: mfl, sto

Referenti: Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno

Confini: Accesso dalla strada che dalla fondovalle Taro (S.P. 66) sale alla loc. Case Ghirardi. Confina a Est col la S.P. Borgo Taro-Bardi e con la strada per MonteRizzone, a Sud segue in parte il confine Comunale Albareto - Borgo taro, a Ovest segue il torrente Remola e il Canale Guasto, a Nord confina con la loc. Porcigatone.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Proprietà non indicate**PORTASEME**

Portaseme non indicati

Motivi di iscrizione:

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 602

massima: 754

ESPOSIZIONE primaria: 293°-337°

secondaria: 123°157°

Inclinazione° : n.i.

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): n.i.

Precipitazioni medie estive (mm): n.i.

Temperatura media annua (C): n.i.

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Medio versante**Substrato:** Argilliti e siltiti

Suoli: Mat. di origine franosa o deriv. da argilliti o peliti intercalate a rocce arenacee o calcaree, altre volte da argille inglobanti corpi calcarei, arenacei, talora ofiolitici (Arenarie di Ostia, Argille a Palombini, Unita' del Canetolo, Complesso Caotico) che hanno dato origine a suoli 6Ba a pendenza tipica 8 -20%; molto profondi; a tessitura media; a moderata disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono ripidi, superficiali e a buona disponibilita' di ossigeno. Tali suoli si mescolano a suoli 6Fb e 6Fd a forte differenziazione del profilo, decarbonatati (Eutric Cambisols, localmente Dystric Cambisols); suoli subordinati a differenziazione moderata, per ruscellamento, con decarbonatazione incipiente (Calcaric Cambisols).

Tipi forestali: Querceto quasi puro delle colline emiliane riconducibile al Querceto acidofilo a prevalenza di cerro.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: ceduo semplice, con o senza matricine**Forma di governo secondaria:** ceduo in conversione**Fase di sviluppo:** ceduo giovane**Struttura:** biplana

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione pianificata:**Situazione evolutivo-culturale:**