

SCHEDE: 0188 - Perinaia

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 510

Tipo popolamento: Di riserva

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: FC Comuni: S.Sofia

Tavola CTR: 265-SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 723840

Superficie totale: 0,4 ha

N 862070

SPECIE IDONEE: Arboree principali: oca, qce

Referenti: Ente Gestore Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Confini: Dalla ex SS 310 Bidentina, in località Corniolino svoltare per la strada per S. Agostino ed in località Fiumari proseguire per San Paolo in Alpe. Fascia di circa m. 10 a valle della strada forestale dalla località di Perinaia alla località di Fonte della Misericordia presso Ronco del Ciano.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Proprietà non indicate**PORTASEME**

Portaseme non indicati

Motivi di iscrizione: Piante di facile accessibilità e comodità di raccolta e di sicuro indigenato con caratteristiche di buona struttura

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 764

massima: 790

ESPOSIZIONE primaria: 66°-122°

secondaria: 123°-157°

Inclinazione° : 27

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): 1300

Precipitazioni medie estive (mm): n.i.

Temperatura media annua (C): n.i.

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Medio versante**Substrato:** Arenarie

Suoli: Suoli poco evoluti d'erosione per ruscellamento (Calcaric Regosols); suoli subordinati a forte differenziazione del profilo, decarbonatati (Eutric Cambisols).

Tipi forestali: Ostryo-cerreto**POPOLAMENTO FORESTALE****Forma di governo principale:** ceduo in conversione**Forma di governo secondaria:** rimboschimento / fustaia artificiale**Fase di sviluppo:** fustaia giovane / adulta**Struttura:** monoplana**DATI DENDROMETRICI**

Numero piante ad ha: 1800

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): 32,0

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): 12

Altezza media (m): 10

Diametro medio di area basim. media (cm): 10,0

Gestione pianificata: Piano Economico Bidente di Corniolo

Situazione evolutivo-culturale: Ceduo semplice matricinato invecchiato (ultimo taglio presumibile del ceduo nel 1950-1960) composto in prevalenza di carpino nero e cerro in evoluzione guidata mediante tagli di diradamento (conversione all'alto fusto) verso una fustaia transitoria di cerro misto a latifoglie varie. Rinfoltimento artificiale sia di conifere (pino nero e pino silvestre) che di latifoglie (acero montano).