

SCHEDE: 0088 - Pagazzano

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 410

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: PR Comuni: Berceto

Tavola CTR: 198 SE, 216 NE, 217 NO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 577563

Superficie totale: 2876,8 ha

N 935001

SPECIE IDONEE: Arboree principali: for, qpu

Referenti: Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno

Confini: Accesso dal fondovalle Val Taro S.S. 308, S.S. 62 della Cisa. Confina a Est con la SS Cisa, a Nord con il Rio Orlando e con il Torrente Grontone fino alla confluenza con il Fiume Taro. A ovest confina con l'autostrada A 15 e a Sud con il Rio di Rocca Prebalza.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Proprietà non indicate

PORTASEME

Portaseme non indicati

Motivi di
iscrizione:

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 617

massima: 988

ESPOSIZIONE primaria: 293°-337°

secondaria: 123°157°

Inclinazione° : n.i.

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): n.i.

Precipitazioni medie estive (mm): n.i.

Temperatura media annua (C): n.i.

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Medio versante

Substrato: Arenarie

Suoli: Materiali di origine franosa e in materiali derivati da rocce stratificate calcareo- marnose, con strati pelitici (Flysch di Monte Caio che danno luogo a suoli 6Bb a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate di terra, scorrimenti rotazionali, con decarbonatazione incipiente (Calcaric Cambisols); suoli subordinati poco evoluti d'erosione per ruscellamento (Calcaric Regosols). Tali materiali si alternano a mat. di origine franosa o deriv. da argilliti o peliti intercalate a rocce arenacee o calcaree, altre volte da argille inglobanti corpi calcarei, arenacei, talora ofiolitici (Arenarie di Ostia, Argille a Palombini, Unita' del Canetolo, Complesso Caotico) che danno luogo a suoli 6Ba a pendenza tipica 8 -20%; molto profondi; a tessitura media; a moderata disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono ripidi, superficiali e a buona disponibilita' di ossigeno. Nell'area si rinvencono anche suoli 6Fc a pendenza tipica 8 -20%; molto profondi; a tessitura media; a moderata disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono ripidi, superficiali e a buona disponibilita' di ossigeno.

Tipi forestali: la copertura vegetale dell'area è costituita prevalentemente dalle tipiche formazioni boschive del medio Appennino, formate da Querceti mesoxerofili di roverella, localizzati sui versanti più caldi, ed Ostietri mesofili sul versante settentrionale ed orientale, in mosaico a lembi di Castagneto.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: ceduo semplice, con o senza matricine

Forma di governo secondaria: non definita

Fase di sviluppo: ceduo adulto/maturo

Struttura: monoplana

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione
pianificata:Situazione
evolutivo-culturale: