

SCHEDA: 0006 - Cerignale

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 420

Tipo popolamento: Di riserva

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: PC Comuni: Cerignale, Ottone

Tavola CTR: 197-SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 528272

Superficie totale: 597,6 ha

N 945730

SPECIE IDONEE: Altre specie arboree: jre, pav, ppy, sau

Arbustive: cav, cmo, jco

Referenti: Comunità Montana dell'Appennino Piacentino

Confini: popolamento dell'Alto Appennino piacentino, localizzato fra i bacini dei Torrenti Trebbia e Aveto, su substrati ofiolitici. Il popolamento da cui può avvenire la raccolta del seme insiste sul versante Nord-orientale del SIC IT4010013 (Monte Dego, Monte Veri, Monte Tane) ed è raggiungibile tramite la strada provinciale n°52 Cerignale-Rovereto; all'interno della stazione la percorribilità è garantita da diverse strade a fondo naturale che si diramano a partire da quella principale.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale**Agibilità:** Agevole**PROPRIETÀ:** Proprietà non indicate

PORTASEME

Portaseme non indicati

Motivi di iscrizione: l'area compresa fra gli alti bacini dei T. Trebbia e Aveto (IT4010013 - Monte Dego, Monte Veri, Monte Tane) presenta una rilevante abbondanza di arbusti e di specie arboree secondarie come il ciliegio ed i sorbi. La situazione evolutivo-culturale, caratterizzata da cenosi aperte e, localmente, da boschi radi, è molto favorevole alla fruttificazione di alcune specie arbustive che, pur presenti altrove, trovano raramente le condizioni di luminosità ideali per la fruttificazione. L'accessibilità è buona e garantita dalla strada che da Rovereto porta a Cerignole, unitamente a sentieri e strade a fondo naturale. Nel sito, inoltre, sono presenti numerosi individui o gruppi di noce comune fruttificanti; in generale si tratta di soggetti con fusto cilindrico, rettilineo e caratterizzato da una corteccia a grana fine; la chioma, tendenzialmente, simmetrica, priva di rami epicornici, è contraddistinta da branche principali rettilinee e slanciate. All'opposto, i soggetti di ciliegio si presentano con un fenotipo mediocre per la presenza di un fusto tozzo, tendenzialmente contorto e con chioma globosa, espansa e piuttosto ramosa, già a partire dai primi metri, tale portamento imputabile presumibilmente alla crescita in pieno campo, più che all'adattamento stazionario, non dovrebbero influire negativamente sull'impiego della specie, che peraltro è rappresentata da soggetti adulti abbondantemente fruttificanti.

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 987

massima: 1185

ESPOSIZIONE primaria: 158°-202°

secondaria: Non disponibile

Inclinazione° : 14

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): 1260

Precipitazioni medie estive (mm): 218

Temperatura media annua (C): 3,0

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Alto versante**Substrato:** Marne

Suoli: suoli con forte differenziazione del profilo e debole acidificazione negli orizzonti superficiali. Suoli molto ripidi, rocciosi, profondi o molto profondi, a tessitura media, ciottolosi o molto ciottolosi, a buona disponibilità di ossigeno, non calcarei, debolmente acidi negli orizzonti superficiali, neutri in profondità. Localmente i suoli sono molto superficiali, debolmente alcalini o fortemente acidi negli orizzonti superficiali e nella parte superiore di quelli profondi, moderatamente o debolmente acidi nella parte inferiore e nel substrato. Questi suoli sono formati dall'alterazione di rocce stratificate calcareo-marnose, talvolta, da peliti. Secondo la classificazione FAO, rientrano nei Eutric Cambisols e localmente nei Dystric Cambisols e Mollic Leptosols.

SCHEDA: 0006 - Cerignale

Tipi forestali: le categorie prevalenti nel sito sono rappresentate da Faggete, Rimboschimenti di pino nero e lembi di Castagneto da frutto. Particolarmente interessate ai fini della raccolta di materiale di propagazione risulta il versante Nord-orientale del Sito caratterizzato da cenosi arbustive a prevalenza di nocciolo, biancospino, ginepro e diverse rosacee, in mosaico con aree attualmente pascolate.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: non definita

Forma di governo secondaria: non definita

Fase di sviluppo: non definita

Struttura: non definita

DATI DENDROMETRICI **Numero piante ad ha:** 1173 **Area basimetrica media ad ha (mq/ha):** 7,0

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i. **Altezza pianta dominante (m):** n.i.

Altezza media (m): n.i. **Diametro medio di area basim. media (cm):** 8,0

Gestione Dato non disponibile
pianificata:

Situazione per quanto concerne gli arbusteti la tendenza dinamica attualmente in corso delinea una
evolutivo-culturale: progressiva chiusura degli spazi aperti di tipo pascolivo ad opera della vegetazione pioniera legnosa (nocciolo, ginestre, rose e altri arbusti); per tale motivo si ritengono necessari interventi, più o meno incisivi, di descespugliamento e di contenimento della vegetazione arborea invadente; nella fattispecie sono possibili locali ceduazioni della cenosi forestali prossime alle radure.