

SCHEDA: 0069 - Pineta Casalborsetti

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 220

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Soprassuolo

Provincia: RA Comuni: Ravenna

Tavola CTR: 223-NE; 223-SE

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 760513

Superficie totale: 162,6 ha

N 933687

SPECIE IDONEE: Arboree principali: ppi, ppe

Altre specie arboree: pal

Referenti: Ente Gestore Parco Regionale Delta del Po

Confini: Dalla SS 309 Romea seguire le indicazioni per Marina di Romea-Porto Corsini. Il soprassuolo, incluso nel SIC IT4070005 (Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini), occupa una sottile fascia fra gli insediamenti turistici di Marina di Romea e Porto Corsini ed il mare.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Proprietà non indicate

PORTASEME

Portaseme non indicati

Motivi di iscrizione: Nel panorama regionale dei popolamenti di conifere della costa adriatica, gli impianti di Marina di Romea si caratterizzano per la significativa presenza del pino marittimo, per la buona accessibilità e per l'abbondante fruttificazione; ulteriore elemento positivo è la presenza del SIC e dell'Area protetta del Delta del Po.

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: n.i.

massima: 3

ESPOSIZIONE primaria: Pianeggiante

secondaria: Pianeggiante

Inclinazione° : 0

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): 599

Precipitazioni medie estive (mm): 149

Temperatura media annua (C): 9,6

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Spiaggia**Substrato:** Sabbie

Suoli: Suoli della pianura costiera, pianeggianti con pendenza che varia tipicamente da 0,05 a 0,1%; molto profondi; a tessitura grossolana; a moderata o buona disponibilità di ossigeno; calcarei; debolmente o moderatamente alcalini.

Questi suoli si sono formati da sabbie di dune; hanno un grado di differenziazione del profilo molto basso, con idromorfia a diversa profondità nel substrato. Rientrano nei Calcaric Arenosols, secondo la Legenda FAO (1990).

Tipi forestali: Pineta di pino domestico e marittimo, localmente in mescolanza con pioppeti di pioppo bianco e qualche ceppaia di ontano nero.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: rimboschimento / fustaia artificiale**Forma di governo secondaria:** non definita**Fase di sviluppo:** fustaia giovane / adulta**Struttura:** biplana

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione pianificata: Stazione Pineta di S.Vitale e Piallasce di Ravenna (adottato con delib. Consiglio comunale di Ravenna n. 23841/279 del 14.5.1991);

Situazione evolutivo-culturale: Da un punto di vista strutturale queste pinete si presentano molto uniformi e riconducibili ad un'unica tipologia strutturale, corrispondente alla fustaia adulta monoplana con di diametri da piccoli a medi (diametri massimo 40 cm). Le geometrie dell'impianto sono ancora ben visibili; solo localmente si sono verificati crolli che hanno permesso l'ingresso di latifoglie quali leccio, farnia, pioppo bianco, frassino ossifillo. Nelle parti centrali, ovvero nei settori meno disturbati, sono presenti spessine di diverse latifoglie, fra cui prevale l'orniello. In tutti i casi lo strato arbustivo è sempre molto denso.

SCHEDA: 0069 - Pineta Casalborsetti

Nei settori più prossimi al litorale, vi sono tratti di pineta molto giovane, riconducibile alla giovane perticaia; in questi casi il popolamento artificiale, è misto fra pino domestico, marittimo. I Nuclei di querceto planiziale e di lecceta sono localizzati nel settore più meridionale del SIC, nei pressi di Porto Corsini; nella medesima zona è presente un relitto di duna con pini. In alcune bassure sono presenti piccoli nuclei di ontano nero a ceduo