

SCHEDA: 0082 - Vairo

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 420

Tipo popolamento: Di riserva

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: PR Comuni: Palanzano

Tavola CTR: 217SE

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 596044

Superficie totale: 890,9 ha

N 919363

SPECIE IDONEE: Arboree principali: qce

Altre specie arboree: msy, tvu

Arbustive: vop

Referenti: Comunità Montana Appennino Parma Est

Confini: Accesso dalla Strada n. 513 Val d'Enza, da Ramiseto e Selvanizza. Confina a Nord con la strada per Palanzano, a Est con la S.P. Massese, a Sud con il Fosso Canalaccio e a Ovest sul versante occidentale del M. Vairo e del M. Faggeto.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale**Agibilità:** Difficoltosa**PROPRIETA'** Proprietà non indicate**PORTASEME** tvu UTM E 596422; N 920310 Costa d'Oro

tvu UTM E 594506; N 918480 Laggione

tvu UTM E 595577; N 918501 Monte di Vairo

Motivi di iscrizione: Nel panorama regionale, ove gli esemplari di tiglio allo stato naturale sono piuttosto limatati in termini numerici, la suddetta area di raccolta acquista un'elevata importanza per la raccolta di materiale di propagazione forestale.

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 950

massima: 1284

ESPOSIZIONE primaria: 66°-122°

secondaria: 123°157°

Inclinazione°: n.i.

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): n.i.

Precipitazioni medie estive (mm): n.i.

Temperatura media annua (C): n.i.

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Medio versante**Substrato:** Marne

Suoli: Mat. di origine franosa o deriv. da argilliti o peliti intercalate a rocce arenacee o calcaree, altre volte da argille inglobanti corpi calcarei, arenacei, talora ofiolitici (Arenarie di Ostia, Argille a Palombini, Unita' del Canetolo, Complesso Caotico). Suoli 7Ad decarbonatati; a forte differenziazione del profilo con frequente debole acidificazione negli orizzonti superficiali (Eutric Cambisols), subordinatamente a debole differenziazione del profilo (Eutric Leptosols o Eutric Regosols), alternati a suoli 6Ba con pendenza tipica 8 -20%; molto profondi; a tessitura media; a moderata disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono ripidi, superficiali e a buona disponibilità di ossigeno.

Tipi forestali: la copertura vegetale dell'area è costituita prevalentemente dalle tipiche formazioni boschive del medio Appennino, formate da Querceti mesoxerofili di roverella, localizzati sui versanti più caldi, ed Ostietri mesofili sul versante settentrionale ed orientale, in mosaico a lembi di Castagneto.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: ceduo semplice, con o senza matricine**Forma di governo secondaria:** ceduo in conversione**Fase di sviluppo:** ceduo invecchiato / in conversione spontanea o guidata (non a regime)**Struttura:** monoplana

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione pianificata: Parte della superficie ricade nel Piano di Assestamento dell'Uso civico di Vairo-Perdera

Situazione evolutivo-culturale: