

SCHEDA: 0168 - Riolo Terme

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 330

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: RA Comuni: Riolo Terme e Brisighella

Tavola CTR: 239SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 718899

Superficie totale: 320,8 ha

N 905289

SPECIE IDONEE: Arboree principali: sal
Altre specie arboree: pni
Arbustive: aca

Referenti: Comunità Montana Appennino Faentino

Confini: Confina a Nord con il Torrente Senio, a Est con il Torrente Sintra, a Sud con la loc. Cà Pollaiolo,
a Ovest con Cà la Derchia.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Proprietà non indicate

PORTASEME qpu UTM E 720060; N 906016 Casa del Fiume
qpu UTM E 719495; N 905847 Passerina
qpu UTM E 718507; N 905521 Villa Schiavo
aca UTM E 718174; N 904506 Golf Club Riolo Terme
aca UTM E 718402; N 905263 Villa Schiavo

Motivi di iscrizione: Pianta di facile accessibilità e di comodità di raccolta, anche se la presenza del corso d'acqua
può renderla difficoltosa. Sono piante di sicuro indigeno e con caratteristiche di buona
struttura; per l'acero si tratta di piante con buona longevità provenienti da ex filari maritati.

DATI STAZIONALI	QUOTE minima: n.i.	media: 143	massima: 230
ESPOSIZIONE primaria: 338°-22°	secondaria: Non disponibile	Inclinazione° : 5	
CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): n.i.	Precipitazioni medie estive (mm): n.i.		
Temperatura media annua (C): n.i.	Indice di Gams: n.i.	Indice di Rivaz: n.i.	

Morfologia: Terrazzo antico (pianalto) a superficie ondulata

Substrato: Sabbie

Suoli: Antichi sedimenti fluviali a tessitura media e, localmente, fine hanno dato luogo a suoli 3Bc a pendenza tipica 0,2-0,8%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente hanno tessitura fine e disponibilità di ossigeno moderata. Tali suoli si alternano al tipo 3Af con caratteristiche analoghe e talvolta al tipo 5Ba con pendenza tipica 15-30%; superficiali; a tessitura fine; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Sono inoltre frequentemente rocciosi. Localmente sono moderatamente profondi, a tessitura media. Mod.frequenti i calanchi.

Tipi forestali: Saliceto di salice bianco e pioppo bianco, localmente con la var. con ontano nero.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: non definita

Forma di governo secondaria: non definita

Fase di sviluppo: non definita

Struttura: non definita

DATI DENDROMETRICI	Numero piante ad ha: n.i.	Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.
	Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.	Altezza pianta dominante (m): n.i.
	Altezza media (m): n.i.	Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione
pianificata:

Situazione
evolutivo-culturale: