


AUTORITA' di BACINO del RENO
Bacino del torrente Samoggia
allegato tecnico A
**Analisi della consistenza delle fasce tampone
e del grado di criticità funzionale**
TAVOLE
A cura di Biol. Lorenzo Canciani
elaborazioni Sebastiano Correggiari
Bologna, 2006
**Analisi Fascia Tampone
grado di efficacia**

**Analisi Criticità
livello di criticità funzionale**


sigla	Descrizione qualitativa della fascia tampone arborea
1cA	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti + fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
1sA	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità > di 20 m
1sB	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità compresa tra 10 e 20 m
1sC	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità < di 10 m
2cA	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto + fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
2sA	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto. Profondità > di 20 m
2sB	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto. Profondità compresa tra 10 e 20 m
2sC	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto. Profondità < di 10 m
3cA	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata + fascia retrostante di vegetazione boschiva. Profondità > di 20 m
3sA	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità > di 20 m
3sB	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità compresa tra 10 e 20
3sC	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità < di 10 m

