

Bacino del torrente Samoggia

allegato tecnico A

Analisi della consistenza delle fasce tampone e del grado di criticità funzionale

TAVOLA 8

A cura di Biol. Lorenzo Canciani
elaborazioni Sebastiano Correggiani Bologna, 2006

Analisi Fascia Tampone grado di efficacia
 I
 II
 III
 IV
 Alveo

Analisi Criticità livello di criticità funzionale
 Assente
 Elevato
 Moderato

asta torrente Lavino
 Confini Comunali Savigno, Monte S. Pietro, Sasso Marconi

scala 1:5.000 C.T.R. Rer: 237021-022, 220142-153

sigla	Descrizione qualitativa della fascia tampone arborea
1CA	Alneti. Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti + fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
1CA	Alneti. Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità > di 20 m
1B	Alneti. Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità compresa tra 10 e 20 m
1C	Alneti. Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità < di 10 m
2CA	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto + fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
2CA	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto. Profondità > di 20 m
2B	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto. Profondità compresa tra 10 e 20 m
2C	Boschi degradati di robinia con sporadici nuclei di salico-pioppeto. Profondità < di 10 m
3CA	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata + fascia retrostante di vegetazione boschiva. Profondità > di 20 m
3A	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità > di 20 m
3B	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità compresa tra 10 e 20 m
3C	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità < di 10 m

